Actualización de la situación de la Influenza Aviar

La EFSA ha publicado recientemente un informe en que actualiza la situación epidemiológica de la IA de la presente temporada 2021-2022 en la UE.

La agencia actualiza el número de brotes en la **actual temporada a nivel de la UE**, habiendo sido notificados un total de **2653 focos de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en 33 países de la UE**, desde el 9 de diciembre al 15 de marzo. La mayoría de ellos declarados en **Francia, Italia, Hungría y Polonia**.

- Los virus mantienen su **preferencia por las aves**, aunque se han hallado **adaptaciones a mamíferos**, pero de forma **esporádica**.
- En comparación con la temporada anterior, IAAP ha sido hallada **no solo en aves acuáticas sino en un amplio abanico de otras aves salvajes**. Esto ha favorecido la transmisión a aves de corral. Se prevé que este **aumento de carga vírica** supone un aumento potencial de infección para las aves de corral que, posiblemente, **persistirá en los próximos meses**.
- Los **numerosos casos confirmados en aves de corral de producción intensiva (broiler)**, considerados de riesgo bajo ya que son criados en interior, hacen sospechar que las capacidad y efectividad de las **medidas de bioseguridad aplicadas siguen sin ser eficaces**.
- **La transmisión de virus subtipo H5 a humanos** en Reino Unido, Rusia y Nigeria; animales salvajes en toda Europa, junto con los casos confirmados en humanos del subtipo H5N6 en China **subraya la capacidad zoonótica del virus de la IA y la posible adaptación de estos virus a otros mamíferos**.
- No obstante, el **riesgo de contagio** para la **población en general se considera bajo**. Aunque en el caso de las **personas en contacto con aves de bajo a medio**.
- La **persistencia y la continua circulación del virus de la IAAP** en aves migratorias y de corral, seguirá siendo un **riesgo para el sector avícola en Europa**. Esto requiere de la **implementación de estrategias de mitigación** basadas en: medidas de bioseguridad eficaces, planes de vigilancia y medidas de detección precoz en los diferentes sistemas de producción.
- La **detección precoz junto con una respuesta rápida**, sumado a todo lo anterior mencionado, **reduce el periodo de riesgo alto de la epidemia y previene focos secundarios**, sobre todo en zonas con **alta densidad avícola**. Es por ello que las

Autoridades Competentes deberían informar al sector sobre su importancia e implementar medidas efectivas para minimizar el riesgo de exposición en las personas dedicadas al sector.

- **Enfoque One Health** en el refuerzo de la **vigilancia en mamíferos y humanos** potencialmente expuestos al virus, con con la **implicación de Salud Pública y los organismos oficiales de riesgos laborales**; en especial, en los casos en los que **se declare la enfermedad**, el **personal** encargado de realizar los **vacíos sanitarios** (conjuntivitis). Se recomienda en estos casos a realizar estudios **serológicos** a estas personas.

Nuevo informe del nivel del bienestar animal en granjas

La CE ha publicado un informe que analiza los últimos resultados de los controles oficiales sobre el bienestar animal en las explotaciones ganaderas y describe algunos de los sistemas implantados para medirlo.

Los resultados de las últimas auditorías de la Comisión sobre los controles oficiales indican que existen dificultades para aplicar sistemas eficaces de seguimiento del progreso del bienestar animal en explotación. Y es que, no existe un conjunto único de indicadores universalmente aceptados para medirlo.

Los datos reflejan el cumplimiento o no de los requisitos legales, pero no analizan la gravedad del problema, y no dan suficiente información acerca de la situación real de los animales.

El informe menciona algunos de los sistemas implantados en algunos Estados miembros que han comenzado a utilizar indicadores basados en el estado general del animal (Italia-corte de colas en cerdos y Holanda- estado de gallinas ponedoras) más que en el suministro de recursos en la explotación (p.e animales enjaulados, masticables).

La conclusión del informe es que se hace necesario establecer indicadores específicos y apropiados en el marco de la actual revisión de la legislación de la UE sobre el bienestar de los animales.

Nueva infografía sobre medicamento veterinario

Elika ha elaborado una infografía en la que recoge las modificaciones más importantes del nuevo [Reglamento 2019/6 sobre el medicamento veterinario](#), con el fin de facilitar su

comprensión.

Tras la publicación de la entrada en vigor, el pasado 28 de enero, de este nuevo Reglamento del que nos hicimos eco al publicar [esta noticia](#), Erika publica ahora la siguiente infografía que resume las modificaciones más importantes de esta norma:

Ponemos a disposición de los profesionales del sector la infografía en versión imprimible:

Euskadi libre de tuberculosis bovina

La Comisión Europea ha declarado recientemente a Euskadi como región libre de tuberculosis bovina.

Las autoridades presentaron a la Comisión información que demostró que en la CAPV se cumplen las condiciones para el reconocimiento del estatus de libre de enfermedad para la infección por el complejo *Mycobacterium tuberculosis* (CMTB).

El CMTB está conformado por 3 patógenos diferentes: *M. caprae*, *M. tuberculosis* y *Mycobacterium bovis*. Este último es causante de la mencionada tuberculosis bovina, una zoonosis que sigue siendo preocupante, hoy día, en países en vías de desarrollo.

En el caso de la CAPV, figura desde el 20 de febrero, como zona libre de CMTB en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/620 (anexo II, parte I).

Esto supone un éxito tras años de esfuerzo, realizado por las administraciones públicas y el sector ganadero, a través de las campañas de saneamiento ganadero establecidas en el programa de erradicación de la enfermedad.

Nuevo reglamento sobre el medicamento veterinario

Ha entrado en vigor el Reglamento (UE) 2019/6 que establece la nueva normativa sobre el uso del medicamento veterinario.

Esta norma, que fue adoptada hace 3 años, pero es aplicable desde el pasado 28 enero, tiene su importancia en la consecución de los objetivos a dos niveles: el Plan de Acción Europeo «Una sola salud» y la Estrategia «De la granja a la mesa».

El Reglamento prevé una amplia gama de medidas concretas para [luchar contra la resistencia a los antimicrobianos \(RAM\)](#) y promover un uso prudente y responsable de los antimicrobianos en los animales, tales como:

- La prohibición del uso preventivo de antibióticos en grupos de animales
- Las restricciones al uso metafiláctico de antimicrobianos en animales,
- La prohibición reforzada del uso de antimicrobianos para promover el crecimiento y aumentar el rendimiento (además de la prohibición de 2006 de usar antibióticos como promotores del crecimiento en los piensos).
- La posibilidad de reservar determinados antimicrobianos únicamente para los seres humanos.
- La obligación de los Estados miembros de recopilar datos sobre las ventas y el uso de antimicrobianos en animales.

El objetivo principal es que todos los ciudadanos salgan ganando con esta nueva legislación, sobre todo gracias a las medidas de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, cuya relación con la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente es evidente.

Declarado un foco de influenza aviar en pavos de engorde en Castilla y León

El Laboratorio Nacional de Referencia para la Influenza Aviar (LCV Algete) ha confirmado la detección de IAAP H5N1 en una explotación de pavos de engorde en Segovia.

La granja en cuestión, con un censo de **18900 aves**, supone el **primer foco de IAAP H5N1 en aves domésticas y el cuarto a nivel estatal tras la [declaración de focos en aves silvestres en Lleida, en Ávila y en Palencia](#).**

El municipio donde está situada la explotación ya estaba incluida en la **zona de especial vigilancia por influenza aviar** que establece el Anexo III de la Orden APA/2442/2006, de forma que **ya se habían adoptado medidas** para prevenir brotes en aves de corral. No obstante, **tras la confirmación** por parte del LCV Algete se han adoptado las siguientes medidas establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687:

- Aislamiento e inmovilización de la explotación.
- Investigación clínica para conocer el origen del foco.
- Sacrificio de todo el censo de la explotación.
- Se ha establecido una zona de restricción alrededor del foco donde hay otras 16 explotaciones comerciales y 196 de autoconsumo.

El MAPA destaca que:

- **No hay evidencia de la capacidad zoonótica del subtipo IAAP H5N1, pero aconseja evitar el contacto directo con aves que presenten síntomas y/o muertas.**
 - **No se da la transmisión a través de la ingestión de carne y huevos.**
-

[Declarado un segundo foco de Influenza aviar en Castilla y León](#)

El Laboratorio Nacional de Referencia para la influenza aviar (LCV Algete) ha confirmado la detección de IAAP H5N1 en varias aves silvestres en Palencia.

El ave, en este caso, una cigüeña fue hallada muerta en el municipio de La Nava de Fuentes (Palencia), por agentes medioambientales de la Junta.

Este es el tercer foco de IAAP H5N1 en aves silvestres a nivel estatal tras la declaración en [Lleida de un foco el pasado 4 d enero en el río Segre y el segundo en Castilla y león tras ser declarado uno en Ávila el 14 de enero.](#)

El municipio se asienta en una de las zonas de especial vigilancia establecidas en el Anexo III de la Orden APA/2442/2006, en la que al igual que en las de especial riesgo (Anexo II de dicha Orden) y debido a la situación de riesgo muy alto por la situación epidemiológica en Europa, se han adoptado las mismas medidas adicionales para prevenir posibles brotes de la enfermedad en aves domésticas que en los otros dos focos y se ha reforzado las labores de vigilancia en la zona.

[Brotes de Enfermedades Animales en Europa - Informe Anual ADIS 2021](#)

El Sistema de Información sobre Enfermedades Animales de la UE (ADIS) ha publicado el balance final de brotes de enfermedades animales infecciosas contabilizados el pasado año.

En total el sistema ha registrado un total de 19.623 brotes que resumimos en los siguientes gráficos.

- [Peste Porcina Africana](#)
- [Influenza Aviar](#)
- [Rabia](#)
- [Todas las fichas](#)

[Declarado un foco de Influenza aviar en Ávila](#)

El Laboratorio Nacional de Referencia para la Influenza Aviar (LCV Algete) ha confirmado la detección de IAAP H5N1 en varias aves silvestres en Ávila.

Las aves, **3 gansos comunes y una garza real**, fueron halladas **muertas en la Laguna del Oso**, por **agentes medioambientales** de la **Junta de Castilla y León**.

Este es el **segundo foco de IAAP H5N1 en aves silvestres a nivel estatal** tras la declaración en [Lleida de un foco el pasado 4 d enero en el río Segre](#).

La **Laguna del Oso** esta situada en una de las **zonas de especial vigilancia establecidas en el Anexo III de la Orden APA/2442/2006**, en la que al **igual que en las de especial riesgo** (Anexo II de dicha Orden) y debido a la **situación de riesgo muy alto** por la situación epidemiológica en Europa, se han adoptado **medidas adicionales** para prevenir posibles brotes de la enfermedad en aves domésticas. Estas medidas son: la **prohibición de la cría** de aves de corral **al aire libre**, así como la **presencia** de aves de corral y aves cautivas en los **centros de concentración** de animales, incluyendo los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales.

Tras el hallazgo de las aves muertas y la sospecha de IAAP, los servicios veterinarios oficiales han incrementado las labores de vigilancia:

- **En aves de corral:** Han contactado con todas las explotaciones de las zonas establecidas en el Anexo III de la Orden APA/2442/2006, las que se encuentran en un radio de 10 km alrededor del foco y las que están también en el área de influencia de este humedal.
- **En aves acuáticas:** están realizando un censado de las aves acuáticas y han incrementado la vigilancia para poder detectar cualquier mortalidad anormal en las mismas.

La nota elaborada por el MAPA recoge una **actualización de la situación epidemiológica a nivel europeo publicados en ADIS:** desde **agosto de 2021 hasta el 12 de enero de 2022** se han notificado un total de **1.665 focos de IAAP en 29 países (687 en aves de corral, 978 en aves silvestres y cautivas)**.

[**Declarado un foco en Italia de Peste porcina africana**](#)

Las autoridades italianas notifican un caso de peste porcina africana (PPA) en un jabalí hallado muerto.

Los servicios veterinarios de Italia declararon, el pasado 7 de enero, un caso de PPA en un jabalí hallado muerto en el noroeste del país. Tras la recogida de muestras, el laboratorio nacional de referencia de Perugia desveló que corresponden al genotipo 2, el que está actualmente circulando por el este y centro de Europa.

A pesar de que no es una zona de alta densidad porcina, si bien la densidad de jabalíes silvestres se considera muy elevada, se han adoptado de forma inmediata las medidas de control referentes a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista en la fauna silvestre tales como:

- Activación del centro nacional y local de crisis
- Formación del grupo de expertos para adoptar las medidas adecuadas para limitar la

diseminación de la enfermedad y decidir los límites de la zona de infección

En la zona del foco y área limítrofe se ha puesto en marcha:

- Búsqueda activa de cadáveres de jabalíes
- Control de la caza en la zona
- Visitas de inspección a las explotaciones de porcino y comunicación del riesgo a todos los sectores implicados

Esta notificación supone un nuevo salto a larga distancia del virus hacia el oeste de la UE y un incremento de riesgo a nivel estatal por la cercanía del foco y acerca el virus a nuestras fronteras.

Es por ello fundamental aplicar unas adecuadas medidas de bioseguridad en las explotaciones de porcino, en el transporte animal, así como con relación a los cazadores que viajen a países afectados o de riesgo por la presencia de la enfermedad y que pudieran contribuir, involuntariamente, a la expansión de la enfermedad al regresar.