Actualización situación de la peste porcina africana en Alemania (30/09/2020)

El MAPA ha publicado una nota informativa sobre la situación del brote de PPA en Alemania, donde ascienden a 38 los focos de PPA en jabalíes silvestres (hallados casi todos ellos muertos). Todos estos casos se habrían localizado hasta ahora en dos distritos, ambos en el estado de Brandeburgo.

Dada la intensificación de la vigilancia epidemiológica y de la búsqueda de cadáveres, las autoridades competentes alemanas han notificado a día 30/09/2020, un nuevo foco tras el hallazgo del cadáver de un jabalí localizado en otro distrito diferente del mismo estado, a unos 30 km al norte de los anteriores y apenas a 1 km con la frontera con Polonia.

Este nuevo caso se ha detectado fuera de la zona infectada que ya estaba sujeta a restricciones. En consecuencia, se han adoptado nuevas medidas que se añaden a las ya vigentes:

- Se amplian los límites de la zona infectada abarcando este nuevo territorio
- Se extiende la búsqueda intensiva de cadáveres de jabalí silvestre.

Situación de la Peste Porcina Africana en Europa-Primer foco en Alemania

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica que afecta a cerdos domésticos y jabalíes. *El virus es inocuo para los seres humanos*, pero esta causando importantes pérdidas económicas en muchos países. Actualmente no existe vacuna para la PPA, por lo que, si se produce un brote, puede ser necesario sacrificar un gran número de cerdos de las granjas situadas en las zonas afectadas.

Los Servicios Veterinarios Oficiales de Alemania han notificado, el día 10 de septiembre de 2020, su primer foco de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes, tras la detección del cadáver de un jabalí en avanzado estado de descomposición a unos 3 kilómetros de la frontera con Polonia, en el distrito de Spree-Neiße, perteneciente al estado federal de Brandeburgo.

Con Alemania ascienden a 12 los países actualmente afectados por la enfermedad en la UE, que son Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia (con focos en explotaciones de cerdos domésticos y jabalíes silvestres), Grecia (con un foco en porcino doméstico notificado en febrero de 2020), Bélgica y Hungría (con focos exclusivamente en jabalíes silvestres), y la isla de Cerdeña en Italia, que tiene la enfermedad de forma endémica desde los años 70.

Por otro lado, la EFSA ha iniciado una campaña que tiene por objeto aumentar la sensibilización y el conocimiento de la PPA en nueve países del sudeste europeo (Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Grecia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Eslovenia).

Está dirigida a colectivos y a personas que están en contacto con cerdos domésticos y jabalíes, como ganaderos y cazadores. La EFSA también trabajará con organizaciones veterinarias, asociaciones cinegéticas, agrupaciones de agricultores, funcionarios de aduanas, policía de fronteras, administraciones locales, operadores turísticos y viajeros.

Además, la EFSA ha creado una web donde puede consultarse fichas informativas, infografías, publicaciones elaboradas para las redes sociales y otro material de interés:

Riesgo de diseminación de la PPA en la UE

08/04/14

Desde que la [Peste Porcina](#) Africana (PPA) se introdujera en Georgia en el 2007, se ha extendido por todo el Cáucaso y la Federación Rusa. En julio de 2012, la enfermedad entró en Ucrania y recientemente, en junio de 2013, fue notificada por Bielorrusia. En enero de 2014, fue otra vez detectada y confirmada en Ucrania, tanto en jabalíes como en cerdos domésticos y, **recientemente**, se ha confirmado en **Lituania y en Polonia**, concretamente en **jabalíes**.

La Comisión Europea solicitó al Panel de Salud y Bienestar Animal de la EFSA (AHAW) elaborar un dictamen científico sobre la PPA, con el objetivo de **valorar su prevalencia en los países vecinos de la Unión Europea (UE) y de clasificar las vías de introducción del virus en la UE**. Para ello, el dictamen científico describe:

- La distribución geográfica de los virus de la PPA en países vecinos.
- Las características epidemiológicas de los brotes.
- Los desafíos para la prevención y el control en los países vecinos orientales de la UE.

Principales conclusiones

1. **No hay cambios** en el **genoma secuenciado de la cepa de la PPA** detectada actualmente, en relación a la **detectada en Georgia en el año 2007**.
2. Los estudios laboratoriales y de campo muestran que, a pesar de la alta virulencia de las cepas involucradas, **los signos clínicos en jabalíes y cerdos domésticos no son siempre claros** y dependen de la vía de infección, la dosis infectiva y el estado inmune de la animales.
3. Actualmente no existe una vigilancia serológica en **Georgia, Armenia y la Federación de Rusia**, por lo tanto, la **seroprevalencia real es desconocida**.
4. **No se puede excluir** la presencia, a largo plazo, de **portadores sin sintomatología clínica** en los **países vecinos** infectados de la UE.
5. **El papel potencial de los portadores sin sintomatología clínica** en la epidemiología de la enfermedad, a largo plazo, **no es conocida**.
6. No existe un sistema eficiente de identificación de animales en los **países vecinos infectados de la UE, lo que dificulta su detección**.
7. **Los animales de traspas** son una parte importante de la producción porcina de los países vecinos de la UE afectados y **representan un nicho que facilita la propagación del virus de la PPA**, debido principalmente a la bioseguridad inadecuada, la alimentación con desechos, el posible movimiento de los cerdos infectados o de fómites contaminados y las matanzas domiciliarias.

8. La **caza intensiva de jabalíes en poblaciones afectadas puede aumentar el riesgo de propagación de la PPA**, con consecuencias particularmente graves en las fronteras internacionales.

Más información

- [Dictamen científico](#) - EFSA
- [Ficha PPA](#) - ELIKA
- [Curso on-line sobre PPA](#) - ASFORCE (en inglés)