Influenza Aviar: confirmado un foco de IAAP H5N8 en patos en Las Landas

El Laboratorio Nacional de Referencia para la Influenza Aviar en Francia (ANSES) ha confirmado un foco de IAAP H5N8 en una explotación de 6.000 patos de engorde en Las Landas.

El MAPA ha publicado una nota informativa sobre el foco de IAAP H5N8 en esta granja de patos en el sur de Francia, donde tras una alta mortalidad el 5 de diciembre, se tomaron las respectivas medidas de precaución basadas en normativa europea: el sacrificio de las 6000 aves el día 6 de diciembre y el establecimiento de una zona de protección de 3 km alrededor del foco y una zona de vigilancia de 10 km.

Esta confirmación suma el tercer foco de IAAP H5N8 en Francia en esa semana, ya que se declararon otros 2 focos en aves silvestres, más concretamente, en un ganso encontrado muerto en una zona de humedales en el departamento Loira-Atlántico y tres cisnes en el departamento de Meurthe-et-Moselle.

Se han confirmado desde el 20 de octubre, un total de 569 focos de IAAP, mayoritariamente H5N8 en Europa:

- 11 en aves cautivas
- 47 en aves domésticas
- 511 en aves silvestres31 focos en aves domésticas

En una reciente publicación, el MAPA notificaba el foco de IAAP H5N8 en un halcón peregrino hallado moribundo en Noja (Cantabria). Unos días antes, se publicó otra nota en la que **declaraba el riesgo de circulación de IA de alto a moderado,** debido a la reciente evolución de esta enfermedad en norte y centro de Europa**; y se establecieron una serie de medidas de vigilancia y control** tal como se establece en el anexo II de la Orden APA/2442/2006.

Desde el punto de vista de salud pública es importante recordar que NO se considera un riesgo ya que:

- **se trata de una cepa NO zoonótica que, por lo tanto, no afecta al ser humano.**
- **NO se transmite ni por el consumo de carne de ave ni de huevos.**

Influenza Aviar: confirmada un ave silvestre positiva a IAAP H5N8 en Cantabria

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha notificado la detección del virus de IAAP H5N8 en un halcón peregrino en Cantabria.

El MAPA ha publicado una nota en la que informa sobre el hallazgo del ave silvestre moribundo en el municipio de Noja (Cantabria), cerca del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel; desde donde se trasladó a un centro de recuperación de fauna silvestre y tuvo que ser sacrificada.

Tras la reciente publicación de otra nota informativa **en la que declaraba el riesgo de circulación de IA de alto a moderado en España, debido a la reciente evolución de esta enfermedad en norte y centro de Europa; se establecieron una serie de medidas de vigilancia y control. Gracias a este refuerzo** del componente de vigilancia pasiva que forma parte del Programa Nacional de Vigilancia de la IA, se ha producido el hallazgo.

Se han confirmado desde el 20 de octubre, 470 focos de IAAP en Europa; de los que 441 pertenecen al subtipo H5N8 en:

- 31 focos en aves domésticas
- 7 focos en aves cautivas
- 403 focos en aves silvestres.

Desde el punto de vista de salud pública, no se considera un riesgo ya que:

- **se trata de una cepa NO zoonótica que, por lo tanto, no afecta al ser humano.**
- **no se transmite ni por el consumo de carne de ave ni de huevos.**

Actualización de la rápida propagación de la IA en Europa

La EFSA ha publicado recientemente un informe científico alertando de la rápida propagación de la IA en Europa; e informando del alto riesgo de introducción de la enfermedad en países donde no se había detectado antes.

Varios países europeos, entre ellos Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, y Suecia, así como en el Reino Unido, han notificado más de 300 casos de brotes de IAAP desde el 16 de octubre de 2020.

Aunque la mayor parte de las aves afectadas en estos focos han sido silvestres, este nuevo informe, elaborado por la ECDC y el Laboratorio Europeo de Referencia para la IA, califica como **alta la probabilidad de que el virus se propague de aves silvestres a aves de corral.**

La agencia advirtió recientemente del riesgo de propagación de la IAAP a Europa occidental tras los brotes en aves silvestres y domésticas confirmados en Rusia occidental y Kazajstán durante el verano dado que la región se encuentra en la ruta de migración de otoño de las aves acuáticas silvestres que se dirigen a Europa.

Es importante recordar que, hasta el momento **no se han detectado casos humanos en los**

nuevos brotes y el riesgo de transmisión al público en general sigue siendo muy bajo.

Atendiendo al riesgo existente, es necesaria la monitorizar la evolución de los virus, para poder evaluar así, el riesgo continuo de aparición de nuevos virus o mutaciones genéticas con propiedades relevantes para la salud pública y animal.

Es por eso que la EFSA insta a las autoridades nacionales de los países que potencialmente puedan verse afectados, a que:

- continúen con la vigilancia de aves silvestres y aves de corral
- implementen medidas de control para prevenir el contacto humano con aves infectadas o muertas
- apliquen en sus áreas de alto riesgo las medidas de mitigación de riesgos y bioseguridad reforzada.

La cercanía de la confirmación de un foco en Francia (Córcega) junto con la de las rutas migratorias de las aves silvestres por nuestro territorio, ha hecho necesario adoptar una serie de medidas específicas en determinados municipios de la CAV, tal como se informó recientemente.

Actualización sobre la situación de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5N8 en Europa

El MAPA ha publicado una nota en la que informa sobre la detección de los primeros casos de IAAP en Francia, Bélgica y Suecia.

Tras la actualización ya publicada el pasado 06/11/2020 sobre la situación de los brotes recientes de IA en Europa, **el MAPA ha publicado el 17/11/2020 otra nota** donde actualiza la situación de esta enfermedad y **recopila todos los brotes junto con los primeros casos** que se han dado **en Francia, Bélgica y Suecia.**

El **ADNS** ha recibido **268 notificaciones** de focos de **IAAP** durante este otoño, **desde** la primera confirmación el pasado **17/10/2020** en un cisne mudo en Holanda, de los cuales:

- 211 en Alemania
- 38 en Países Bajos
- 8 en Dinamarca
- 5 en Reino Unido
- 5 en Bélgica
- 1 en Irlanda

H5N8 es el subtipo de virus de IAAP mayoritariamente detectado (252 focos) y según el EURL, fue el mismo que se detectó en el mes de julio en Rusia y

Kazajstán, pero diferente al que circuló en la UE en la primera mitad de 2020.

Hay que **destacar también** que, del total de focos notificados:

- **255** focos han sido notificados en aves **silvestres**
- **12** en aves de **corral**
- **1** en aves **cautivas**

Las **autoridades francesas** notificarán hoy el primer foco de IAAP en Córcega en **aves cautivas,** pero ya han informado sobre las **medidas a adoptar en las zonas de riesgo** para hacer frente a esta enfermedad, **y son:**

- el confinamiento de las aves de corral
- la prohibición de concentración de aves
- la prohibición del transporte y la liberación de aves de caza
- la prohibición del uso de señuelos para la caza

La cercanía de este foco en Francia junto con la de las rutas migratorias de las aves silvestres por nuestro territorio, **elevan el riesgo a alto/moderado, como ya declaró el MAPA el pasado 11/11/2020.**

Esto ha hecho necesario adoptar una **serie de medidas específicas** en municipios que están fijados en los **anexos II y III de la Orden APA 2442/2006**, y que afectan a una **serie de municipios de Euskadi, contemplados en esta orden, y en los que se van a adoptar estas medidas citadas en las próximas semanas.** Los municipios que la citada orden considera zonas de especial riesgo se sitúan en **Álava y son**:

- **Arratzua-Ubarrundia**
- **Barrundia**
- **Elburgo/Burgelu**
- **Legutio**
- **Zigoitia**

Declaración de riesgo alto/moderado de Influenza Aviar en España

El MAPA ha publicado una nota informativa en la que declara que el riesgo de circulación de IA es de alto a moderado dada la actual situación de esta enfermedad en Europa, por lo que establece una serie de medidas de vigilancia y control. En Euskadi, se establecen como zonas de especial riesgo de introducción de esta enfermedad Arratzua-Ubarrundia, Barrundia, Elburgo/Burgelu, Legutio y Zigoitia.

Tras la **actualización publicada el pasado 06/11/2020** sobre la situación de los brotes ocurridos recientemente en Europa (Holanda, Alemania y Reino Unido) sobre esta enfermedad, el MAPA ha publicado otra nota donde realiza un análisis del riesgo de introducción del virus en España, dando como resultado:

- **Riesgo alto en los municipios incluidos como zona de especial riesgo en el anexo II de la Orden APA/2442/2006**
- **Riesgo moderado en los municipios incluidos en la zona de especial vigilancia en el anexo III de dicha Orden**

Y, por tanto, el **MAPA considera necesario adoptar una serie de medidas específicas en municipios** que están contemplados en los **anexos II y III de la Orden APA 2442/2006**. Estas medidas buscan:

- **Reforzar la bioseguridad:** evitar el contacto directo e indirecto entre aves de corral y las aves silvestres migratorias.
- **Reforzar la vigilancia pasiva** tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres.
- **Actualización de los datos de explotaciones avícolas** ubicados en los municipios incluidos en los anexos.
- **Realización de controles sanitarios y análisis periódicos** en función de la evaluación del riesgo.
- **Prohibición** de la presencia de **aves de corral** en los **centros de concentración** de animales.

A nivel autonómico, los municipios que la citada orden considera en sus anexos II y III zonas de especial riesgo se sitúan en Álava y son:

- **Arratzua-Ubarrundia**
- **Barrundia**
- **Elburgo/Burgelu**
- **Legutio**
- **Zigoitia**

La orden **también** contempla como zonas de especial riesgo para la introducción de la IA en Álava, aunque no establece medidas específicas, los siguientes humedales: **Balsas de Salburúa, el Embalse de Zadorra y el de Santa Engracia.**

Por último, es **de vital importancia recalcar la necesidad de reforzar** los siguientes puntos, **dada la cercanía de las rutas migratorias de estas aves con nuestro territorio:**

- notificar cualquier sospecha de forma inmediata a la AC (DDFF)
- evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres
- la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres
- la sensibilización de ganaderos, veterinarios de explotación, cazadores y toda la población en general sobre la influenza aviar altamente patógena, las medidas de precaución y los mecanismos de notificación de aves enfermas o muertas.

Actualización del estado de la Influenza Aviar en Europa

El MAPA ha publicado una nota informativa en la que recopila y actualiza la situación

de los brotes ocurridos recientemente en Europa (Holanda, Alemania y Reino Unido) sobre esta enfermedad altamente contagiosa y extremadamente variable. También da una serie de recomendaciones para su control y prevenir su llegada a través de las aves silvestres en sus rutas migratorias.

Durante este verano se ha confirmado en el sur de Rusia y en la vecina Kazajistán, la circulación de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) del subtipo H5N8 en aves de corral domésticas y aves silvestres.

Dadas las **olas epidémicas ya vividas** en los periodos **2005-2006 y 2016-2017**, la **previsión** es que el **riesgo de difusión** del virus hacia **otras zonas** del noroeste de Europa **aumente**, ya que las **aves migratorias** las cruzan en búsqueda de un invierno más templado y se detienen para alimentarse y descansar, principalmente.

El **laboratorio** de referencia de la UE (EURL) ha **confirmado** la presencia del **subtipo H5N8 de IAAP mayoritariamente**, que coincide con el notificado este verano en Rusia y Kazajstán, pero **distinto** del que circuló en la **UE en la primera mitad de 2020**. A su vez, constata que tanto éste último como el H5N1 detectado, descienden de los H5N8-IAAP detectados en Eurasia y África durante 2016 y 2017.

Se han notificado al ADNS, un total, de 28 casos de H5N8-IAAP, tanto en aves de corral como en silvestres, desde la primera notificación en Holanda el 17/10/2020, apareciendo luego en Alemania (30/10/2020) y Reino Unido después (02/11/2020).Dada la cercanía de las rutas migratorias de estas aves con nuestro territorio, el MAPA recuerda la necesidad de reforzar:

- evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres
- la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres.
- notificar cualquier sospecha de forma inmediata a la AC (DDFF).
- la sensibilización de ganaderos, veterinarios de explotación, cazadores y toda la población en general sobre la influenza aviar altamente patógena, las medidas de precaución y los mecanismos de notificación de aves enfermas o muertas.